


# IMUNIZAÇÃO DO PARANÁ



BCG (*Bacilo Calmette-Guerin*) - previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea)

Hepatite B - previne a hepatite B.

Pentavalente - previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae B*.

VIP - previne a poliomyelite, tipos I, II e III.

Pneumocócica conjug. - previne contra doenças causadas por pneumococo: pneumonia, otites, meningites.

Rotavírus - previne as diarreias por rotavírus.

Meningocócica conjug. - previne doenças invasivas causadas pela bactéria *Neisseria meningitidis* do sorogrupo A, C, W e Y.

Covid-19 - previne contra infecção pela Covid-19.

Influenza - previne o vírus da gripe: H1N1; H3N2 e influenza B.

Febre amarela - previne febre amarela.

Triíplice Viral - previne o sarampo, caxumba e rubéola.

DTP - previne a difteria, tétano e coqueluche.

Hepatite A - previne a hepatite A.

Tetra Viral - previne sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Varicela - previne a varicela.

HPV - previne câncer e verruga genital por papilomavírus humano.

Dupla adulto - previne a difteria e tétano.

dTpa - previne difteria, tétano e coqueluche acelular.

Dengue - previne casos graves de dengue

<sup>1</sup>ATENÇÃO PARA O FABRICANTE DA VACINA COVID-19 (PFIZER - 3 DOSES)

<sup>2</sup>NO CASO DE INDISPONIBILIDADE DA TETRA VIRAL, TOMAR A TRIÍPLICE VIRAL + VARICELA)

<sup>3</sup>PESSOAS QUE RECEBERAM (1) UMA DOSE DA VACINA ANTES DOS 5 ANOS, DEVEM REALIZAR DOSE DE REFORÇO

3 doses. Considerar histórico vacinal.

Dose única aos 11 anos.

Dose única a partir dos 5 anos de idade.

2 doses até 29 anos.

Dose única - 30 a 59 anos.

Dose única aos 9 anos.

3 doses. Considerar histórico vacinal.

Reforço a cada 10 anos.

2 doses aos 10 anos.

3 doses. Considerar histórico vacinal.

Dose única a partir dos 5 anos de idade.

2 doses até 29 anos.

Dose única - 30 a 59 anos.

3 doses. Considerar histórico vacinal.

Reforço a cada 10 anos.

3 doses. Considerar histórico vacinal.

Repetir anualmente.

Repetir semestralmente.

3 doses em qualquer idade gestacional. Considerar histórico vacinal.

Uma dose por gestação (a partir da 20ª sem).

Repetir a cada gestação e/ou purpério.

Repetir a cada gestação e/ou purpério.

Uma dose por gestação (a partir de 28ª sem.)